دراسه حول تاثير مواعيد و كميات الري فى انتاجية و جودة ثمار الكيوي للكاتب : نيرمين

 اعداد من الملف و ، العلميه البحوث و للدراسات تشرين جامعة مجلة انتاج من ملف لكم نقدم اليوم
 الرحيم الرحمن الله بسم
 <table>

 : على الملف يحتوي و

 رجوب حنان
 ذردة نزار الدكتور
 مخول جرجس دكتور
 ومواعيده المضاف الماء كميات تأثير دراسة في إنتاجية وجودة ثمار شجيرات الكيوي باستخدام طريقتين للري:

<"#000080"=color font>

<table/><tr/><th/><font/></font/> الري <table border="0" cellspac`ng="1" cellpadd`ng="1"><tr><th w`dth="750" al`gn="r`ght"><font color="#000080"><b><font face="Tahoma"><font s`ze="4"> ◆<font s`ze="4">بالتنقيط <font/>`rr`gat`on<"4"=s`ze font><font/></font/> والري الرذاذي من تحت تاج الشجيرة <"4"=s`ze font><""=face font><font/>`rr`gat`on Dr`p<"4"=s`ze font><font/></font/> face=""><font s`ze="4"> </th></tr></table>

  <table border="0" cellspac`ng="1" cellpadd`ng="1"><tr><th w`dth="750" al`gn="r`ght"><font color="#000080"><b><font face="Tahoma"><font s`ze="4">معاملات 9 الدراسة شملت لكل طريقة وبثلاثة مكررات لكل معاملة, ويمكن تلخيص النتائج:

<table/><tr/><th/><font/></font/> table> <font/>

<"#000080"=color font>

<table/><tr/><th/><font/></font/> في بالتنقيط الري على الرذاذي الري تفوق -1 كل من: <font/>

<"#000080"=color font>

<table/><tr/><th/></font/><font/></font/> "750"=w`dth th><tr><"1"=cellpadd`ng "1"=cellspac`ng "0"=border table> بالتنقيط الري عند كغ و7.3 الرذاذي الري عند كغ 8.6 )الشجيرة إنتاج متوسط -<font color="#000080"><b><font face="Tahoma"><font s`ze="4">al`gn="r`ght"> الرذاذي الري عند % 18.04) الثمرة في الجافة للمادة المئوية النسبة -).</th></tr></table>

  <font s`ze="4"><font color="#000080"><br> <br> </font></font> <table border="0" cellspac`ng="1" cellpadd`ng="1"><tr><th w`dth="750" al`gn="r`ght"><font s`ze="4"><font color="#000080"><b><font face="Tahoma">و 17.6 % عند الري بالتنقيط).<font/></font/> <br> <br><"#000080"=color font><"4"=s`ze font> <font/>
<"#000080"=color font>

<table/><tr/><th/></font/><font/><font/>. في الأحادية للسكريات المئوية النسبة -<table border="0" cellspac`ng="1" cellpadd`ng="1"><tr><th w`dth="750" al`gn="r`ght"><font s`ze="4"><font color="#000080"><font face="Tahoma">الثمرة (7.64% عند الري الرذاذي و5.8 % عند الري بالتنقيط).<font/></font/><font/>. font><"4"=s`ze font> <font/> <br><"#000080"=color font> <br> <br> <br><table/><tr/><th/></font/><font/><b/><font/>. color="#000080"><br> <br> </font></font> <table border="0" cellspac`ng="1" cellpadd`ng="1"><tr><th w`dth="750" al`gn="r`ght"><font s`ze="4"><font color="#000080"><b><font face="Tahoma">- محتوى الثمرة من فيتامين <""=face font>C<font/> (70.6 مغ/100 غ وزن طازج عند الري الرذاذي و60.8 مغ/100 عند الري بالتنقيط).<font/></font/> <br> <br><"#000080"=color font><"4"=s`ze font> <font/>
<"#000080"=color font>

<table/><tr/><th/></font/><font/><font/>. "0"=border table> الرذاذي الري على بالتنقيط الري تفوق -2<font color="#000080"><font face="Tahoma"><font s`ze="4">cellspac`ng="1" cellpadd`ng="1"><tr><th w`dth="750" al`gn="r`ght"> في:<font/>
<"#000080"=color font> <font/><font/>
<"#000080"=color font><"4"=s`ze font> <font/> <br><"#000080"=color font> <br> <br> <br><table/><tr/><th/></font/><font/><b/><font/>. table> في الذائبة الصلبة للمواد المئوية النسبة -<font color="#000080"><b><font face="Tahoma"><font s`ze="4">border="0" cellspac`ng="1" cellpadd`ng="1"><tr><th w`dth="750" al`gn="r`ght"> الثمرة (13.6 %عند الري بالتنقيط و13.5% عند الري الرذاذي).<font/></font/><b/><font/></font/> table> <font/>

<"#000080"=color font>

<table/><tr/><th/></font/><b/><font/></font/>. الثمرة في العضوية للأحماض المئوية النسبة -<font color="#000080"><b><font face="Tahoma"><font s`ze="4">border="0" cellspac`ng="1" cellpadd`ng="1"><tr><th w`dth="750" al`gn="r`ght"> (1.1 % عند الري بالتنقيط و1% عند الري الرذاذي).<font/></font/><b/><font/></font/>. "0"=border table> <font/>

<"#000080"=color font>

<table/><tr/><th/></font/><b/><font/></font/>. السعة من (78% أيام 3 كل للشجيرة لتر 100 الكمية تفوق -3<font color="#000080"><b><font face="Tahoma"><font s`ze="4">cellspac`ng="1" cellpadd`ng="1"><tr><th w`dth="750" al`gn="r`ght"> الحقلية) على باقي المعاملات في : <font/>

<"#000080"=color font>

<table/><tr/><th/></font/><b/><font/></font/>. "1"=cellspac`ng "0"=border table> عند كغم و10 الرذاذي الري عند كغم 13.3 ) الشجيرة إنتاج متوسط -<font color="#000080"><font face="Tahoma"><font s`ze="4">cellpadd`ng="1"><tr><th w`dth="750" al`gn="r`ght"> الري بالتنقيط).<font/></font/>

<"#000080"=color font>

<table/><tr/><th/></font/><b/><font/></font/>. "750"=w`dth th><tr><"1"=cellpadd`ng "1"=cellspac`ng "0"=border table> حيث المعاملات باقي على ( الحقلية السعة من % 75) أيام 4 كل للشجيرة لتر 100 الكمية تفوق -4<font color="#000080"><font face="Tahoma"><font s`ze="4">al`gn="r`ght"> بلغت أعلى قيمة لمتوسط وزن الثمرة (109 غ عند الري الرذاذي و98 غ عند الري بالتنقيط). وكذلك النسبة المئوية للأحماض العضوية في الثمرة كانت الأعلى عند هذه الكمية (1.1 % عند الري الرذاذي و1.22% عند الري بالتنقيط). <font/>

<"#000080"=color font>

<table/><tr/><th/></font/><b/><font/></font/>. للشجيرة لتر 100 الكمية تفوق -5<font color="#000080"><b><font face="Tahoma"><font s`ze="4">كل 5 أيام (72% من السعة الحقلية) على باقي المعاملات في:<font/></font/> <br> <br> <br><"#000080"=color font> <br> <br> <br><table/><tr/><th/></font/><font/></font/>. table> الثمرة في الأحادية للسكريات نسبة أعلى-<font color="#000080"><font face="Tahoma"><font s`ze="4">% 8.13 عند الري الرذاذي و6.52 % عند الري بالتنقيط). <font/>

<"#000080"=color font>

<table/><tr/><th/></font/><b/><font/></font/>. font><"Tahoma"=face font><b>

<"#000080"=color font>

<table/><tr/><th/></font/><b/><font/></font/>. مغ 72<font s`ze="4">و</font> الرذاذي الري عند طازج وزن غ 100 77مغ )الثمرة في</font> <font s`ze="4">للفيتامين نسبة أعلى-<font s`ze="4">C</font> </font><font face=""> 100 غ وزن طازج عند الري بالتنقيط <font/> <br><"4"=s`ze font><font/></font/> نتركم الآن مع الدراسه ، داعين المولى التوفيق لكل من ساهم فى عرضها و تقديمها

<"\blank_"\=target 'doc.KIWI/2008/10/17/2146875/f`les/com.f`leden.www//:http'=href a>
 ****
 <font/> دراسه حول تاثير كميات و مواعيد الري فى انتاجية و جودة ثمار الكيوي<a/>

 فى امان الله<font/>

زيارة النسخة الأصلية من الدرس

Powered by SaphpLesson 4.0